

Královna Vlastských Hor.^h

Vlastské hory, od některých
Bílých hor postupují východním
směrem mezi Bečovem Hlomou
(Vlastskou) a Blěžem dolní
(Roznovskou). Sledem jejich
směru se směrem na východ
nachází v klášterních vrcholích
Trýzňáka a 953, Výškovku
a 1024, Tančínu a 912,
Lúšovku a 879, Libu a 841,
kterého vrchol Druhý s rozh.
ky a 797, a 742 a a 659,
od kterého dalej k Bečovu Hlomu,
jež se koncům k západu a východu
zvedá se na sever. Od vrchu
v Tančíni všechny vrcholy
se vzdáleností nejvýš 5 km
nizší horský hřeben s tak-
lejšími vrcholy Hradček a 889,
Hájovské díly a 702, Hla-
váčky a 585, Vrch a 693
a konci nad Brnou v m.
a 548. Roklím mezi
oběma horskými vrcholy od-
vadňuje vrchol Bystrčka
s nízklou pochodem v Bystr-
čce vlnující se do Bečovu
a na druhé straně Růždka.

I klášterní hřeben stoupá
k jihu do Blěží Hlomu
pravděpodobně s nejvýznamnějším
vrcholem Babčka, Pachor-
ková, Milotice a Žeženov
a Velkých Karlštejnůch,
Rudkov, Kolyletská a Prostata
a Novém Hlouškově,

Slovenská Biotopie v stolci-
Roví, Bratislavská Slovinská
v Slovinsku, s Čálenem v západ
Síkou k Vádiom protok
Zásmuk. Štělom' ovplyv hor-
šek odvadňují do Bečvy
Roznovské' v obci Stom'kov
je malý pramenek
voda ji pramen Solanecký a
daleko západně pramenek
Hájovka.

Mitglied

utsí ji pramen Solanecký a
daleko západně pramenek
Hájovka.

des Witwen- und Waisen-Institut

A. B. in

für

Herrn

welcher nach § 2 und 4 der Statu
auch alle seit seiner Anstellung in
sammt 6% Verzugszinsen zu Hände
baar und richtig

Wsetin, am

Na vlastní nádaci Bečvy Roz-
novské založil brána zřídel -
sits práci severské vody
nad nádalem byly zkomínány
ve výšce nad 500 m, až
kam seku půjčí dle vody horšek.

^{"vlastský"}
^{x)} Tokto slavík lidově nazývaný
výva spisovatel Matous Václavek
Dr František Dvořák ve Vlasti-
né díl Moravské, v národním
stylu výva se myslí Avram
"rečinský".

[x) Rádel v horní Bečvě 504 m
vysoko n. m. u. m.]

Geologickým proklaadem 3
Vortských hor je proklaadem
práhovým znamením flórou. Na
východních stoloniích K. jih. R.
Bečvě stromy jsou do výšky
jmenovaný vrahového pramene
mimo glyfického proklaadu je
na prvním stupni. Id. hlavní
třebovna na severu a východě význam
ještě proklaadem balvanitý
hmotogenný proklaad magni-
ský vlnatý a v první písce
jeho středové magne-
tismi výšky vzdály vzdálini:
víka, basaltka oliví, kohá
na vlastkách, vlnice horní,
konečka a vlna v celych pro-
klaadech, vzdálosti molinie
na Kosovské, Rosánské letní,
metlice Krišťálka, černýs mo-
ravský a Kočobud proklaad
zde ještě na vlastkách
magnitní, kohák na
střední zádi jížních vzdálin
stoloniích k Bečvě Horní
jmenovaný vzdáliny jež
jižně se vyskytuje.

Do balvanitých vlastkách
magnitního výpradu od
Čálen k Tabánce a daleko
za Bečvou až k Hostýnku
je vlastkám první písce
pravidle hajně proniknuto
křídlem. Vlastkám první
výše jistě na vlastech blíže
Čálen dle červené hliny a dle
červenavé ornice a Tabánce
a Prášné.

Geologické písmeň a deponie
hor popsal J. Blažan a
Geologii Moravy 1897
str. 77-86 a název je dle této

a hledisku geomorfologického
dr. Václava Dědina říká se počet
pohledů a časovou hodinou zde
v roce XXIX.

Mapy: strana 5.

Mitglied

des Witwen- und Waisen-Institut

A. B. in

für

Herrn

welcher nach § 2 und 4 der Statut
auch alle seit seiner Anstellung in
sammt 6% Verzugszinsen zu Hände
baar und richtig

Wsetin, am

Meteorologický průměr byl
zde zpracován jen v městech,
ve Vlastivědi Moravské je
pro obec Holín Bečov ve výši
540 m nad mořem $7,5^{\circ}\text{C}$ roční
průměrné teploty a 980 mm
ročního srážek, pro
Velké Karlovice ve výši
515 m $6,9^{\circ}\text{C}$ průměrné teploty
a 788 mm ročního srážek.
Na horstvách však
průměr průměr jiné, čím
jsou, jen se více srážek a
menší teploty.

Pásmo Krkonošské lesy^{5.}
jež je dle myšlenky odětých
prostředkem na jižních svazích
a R. Černé Vodopád, vede mimo
vzdálenost mezi hřebíčkou a vodou na
východních svazích podél řeky
Labe až na vrchol
jeho zalesnění. Ačkoliv na
svazích východních skloní-
cích se R. říčka Bystrice
a R. Černé Rápoty se
mají místy charakter a podle
vzdálenosti až R. samotnou
Atletickou pravou horou když
jsou i zde vody jen po-
kryty klámy lesem. Přesah
zalesnění a myšlenka všechny
pohledy Valdštejnova mapa
okresu Náchodského a podle
vzdálenosti až místy zalesnění
vznikají pásy lesů
mapa Bečovský 1: 100000.
Tevětínovský vysokouzemí
jeho charakterem svazem
než méně jak v klámy polo-
dní pásy až do výšek

Lelíkův hráze Náchodské
hráze a výška jen do výšky
800 - 900 m a nad tím výškou
jen horní lesy Benešov, Vy-
soke a Trojácky vznikají
nedaře se tu využít zvláštní^{6.}
pásma subalpinské jako
v kontinentálním pohorí. Za-
vojnitské vzdálenosti jen
jsou 2 km. Z druhé strany
alpinistických je na hřebeni
lesní jen Lurisia flavescens
a některé druhy v rodu
Lavomyské lesní jen zde
na hřebeni vzhledem (Phleum
alpinum, Potentilla amara,

Mulgedium alpinum) a někdy
jednou včáční a nespolehlí a
to spíše stáleji ne neváží
jen v středním svahu hory
(*Thalictrum aquilegifolium*,
Aconitum vulpecinum, *Ranunculus polyanthemos*, *Geranium siliculosum*, *Lonicera nigra*)

Mitglied

Sej dny horšího Větrku
Lobelia num, *Lilium mar-
saxum*, *Limnanthes rediviva*.

des Witwen- und Waisen-Institut

A. B. in

fi

Herrn

welcher nach § 2 und 4 der Statut
auch alle seit seiner Anstellung in
sammt 6% Verzugszinsen zu Hände
baar und richtig

Wsetin, am

Popis Ructem podáv-
me dle společenských
rostlinných.

Les les Roky.

Z bývalého města Biskupice,
včetně původní řeky Botiče
trvale a vždy byly porosty
pravidelně jen malec a horky,
počet ročník byl les turkouz
nahrazen kultivarem sarko-
ujícím. Místy domácí růže
mladší lesy bukové, klení
se spony růžové, proti d-
ním zdrojům místní rostliny
červené a především jedle,
pak javor (pln), vodník
lípa, jasan, orka, klen, e-
vropský jilm horní, nemí
stromy, jež se samovolně
vyšírají zanášením
semínk užívají vlastníky.
Nad pravou levou stranou
kromě lesa vznikly
následující menší jasany
Krásné stromy. Avam ke
koridore, západně, levo a jo-
žaly, pak tři *Corylus avellana*,
Crataegus oxyacantha, *Lam-
bgus nigra*, *S. racemosa*,
Rubus idaeus, *R. hispida*
indické *Ribes grossularia*,
Rosa pentandra.

V levém pravém pravém
bucin a jara, počet listí
struktura se nevyvíjela.
Roste *Galanthus nivalis*, *Ga-
gea lutea*, *Hamamelis europaea*,
Isopyrum thalictroides, *An-
emone nemorosa*, *Corydalis cava*,
O. solida, *Dentaria europea*,

D. glomerulosa, Mercurialis perennis, Viola canina, V. sylvestris, Euphorbia amygdaloides, E. dulcis, Primula elatior, Pulmonaria obscura, Sambucus nigra, Glechoma hederacea, G. hirsutissima.

Mitglied

Geboren Schultesii^{x)}

des Witwen- und Waisen-Institut

A. B. in

fi

Herrn

welcher nach § 2 und 4 der Statut
auch alle seit seiner Anstellung in
sammt 6% Verzugszinsen zu Hände
baar und richtig

Wsetin, am

Necotum oblates. Religij ry-
mity list jinym zmodu zakti-
niyje, adolu pindu Party
Paris quadrifolia, Polygonum
verticillatum, Knottia nida-
nis, Achis montana, Mel-
andryum subrum, Hellaria ni-
morum, Acorus spicata,
Cardamine impatiens, C.
sylvestris, Dentaria bulbifera,
Geranium Robertianum, Cir-
caea lutetiana, C. alpina,
P. intermedia, L. longiflora, L.
rapae, Viola nemor, Mon-
trouss hypoleidis, Lychnis chis-
norum, Myosotis silvatica,

Fraga repens, A. genistoides,
Lamium galeobdolon, L. galeobdolon, Stachys sylvatica,
S. alpina, Palma glauca,
Geleopsis speciosa, Kronich-
moniana, V. officinalis, Phyt-
erium spicatum, Grapho-
lium sylvaticum, Stachys dio-
ica, Alliaria officinalis, Hypericum
glandulatum, H. hispanicum,
Capitellum mundum,
Chrysosplenium aromaticum,
Crepis plantaginea nobilis,
Prenanthes suspensa, Sti-
reolum murorum, H.
nigulum, Fructus muricis
Vaccinium dumosum, Carex
punctata, Aconitum maculatum,
Lilium pyrenaicum, Lycopus
europaeus, L. sylvestris,
Cephaelanthus longifolia, Ep-
ipactis helleborine, E. veris,
Rumex acetosella, Thymus
serpyllumoides, Cardamine
hirundo, Linaria vulgaris,
Aconitum agrimonoides,
Potentilla procumbens,
Achardia major, Corpol-
lans Ledebouri.

Naad kryt bylinnyj ry-
mityj kapari Nepeta officinalis,
filix mas, Phragmites australis
(femina), N. spinulosum,
N. austriacum, Polysti-
gium lobatum, Linum hybridum
Aravin Melica uniflora,
Festuca rubra, F. gigantea,
Poa nemoralis, Brachypodium
rufum, Bromus ramosus,
Dactylis glomerata, Milium
effusum, Oryzopsis europaea,
Deschampsia caespitosa, D.
flexuosa, Carex sylvatica.

Na konci leta bylin pinda
vistlych krytin zavita' polenem

Oxalis acetosella a *Asperula*
vulgaris, rýjíčka nad ní vymohly;
Impatiens noli tangere a *Lin-*
cis Fischieri, obě po mohly,
z hlyzmi kruž obrouží niz
celého hřibového krytu
zamotájíce celé hřiby
také mohly.

Mitglied

Egri natione sibiricae
Baroness Anna

des Witwen- und Waisen-Institut

A. B. in

fi

Herrn

welcher nach § 2 und 4 der Statu
auch alle seit seiner Anstellung in
sammt 6% Verzugszinsen zu Hände
baar und richti

Wsetin, am

Toto dnu posledním dnebý
kýreji a prvním slavnosteli
že a mopek sas dnebý
sečí i mopek a na Kra-
jich mohlych bučin, jinou
to Agrostis vulgaris, Cala-
magrostis epigejos, Salix co-
mpacta, Rubus idaeus, R. his-
pida, Fragaria vesca, F. moschata
Cytisus angustifolius
Arysia bellidiformis, Verbes-
inum chaerophyllum, Senecio vis-
carius, Anthoxanthum odoratum
Zelkova carpinoides, Laurus nobilis
od edáma pásanals, zvěstí v
srpu, když pošky v mohly
lesoch vymohly, když do nich
delyškem zarůzemy dnebý

praktisimí, miderom Ru-^{11.}
mex obtusifolius, R. acetos-
ella, R. acetosa, Ranuncu-
lus repens, Rosella for-
menilla, Melampyrum infa-
cio, Primula vulgaris, Paeonia
chamaedrys, Plantago lanceolata, Leontodon hispida
i L. antirrhinalis

Na všeobecích mohly leme
zvazují se dny hypolefilum
Ranunculus lanuginosus,
Chrysanthemum alternifol-
ium, Cicuta luteola,
P. alpina, P. intermedia,
(Petasites albus), Chrysanth-
emum pinnatum, Senecio
viscosus, Cephaelis palustris
Také polozne' Rostena rotu-
mij z idoli vahou prole
polozki do leon, zvěstí ko-
rov a v řím, z vrb zvěstí
Salix ericetorum, per Calathus
petiolaris, Geum rivale, Molli-
ous villosus, Agrostis
pratensis, Valeriana offici-
nalis, Mentha villosa, Gen-
pativum camtschaticum
Cirsium rivulare, C. pedatum

Větvičky dny horšek,
zvěstí per dny meal-
jovské vedené zde na
trubini a na vachách, ale z
dolejí pod hřívou také
hypolefilum řeh, tak Carex
elongata (v Babské), Carex
lepidocarpa (v Pastorek),
Gennarium pectinatum (v Brodce)
Artemesia silvestris (~ Divo-
sici), Ranunculus polyan-
tholius (v Babské), Lomian
nigra (Babská, Radkov),
Nephrolepis muricata
a Blechnum spicant
(Milonov a Pastorek),
Doronicum austriacum
(Milonov Babská a Žirm)
aké a hajné v nejštěch
jmé brždých bylém bylém

Luxuria silvatica a *Thalictrum aquilegiifolium*.

V původním bukovém
pralese rostl i jin., výlu-
ben byl jin' množ. do lety.
Ve Vel. Karlovičích jsou
zachovány na parkovištích
2 lisy několik set let stá-
ré, zdejší nové lesy mají
druhy na Biologické, jiné
jsou popisány a uvedeny
v knize Národního Valašsko
2931 str. 218.

Fonds-Administrator

13. Mladé některé nejméně
druhy starých bučin:

1) Starý les bukový s buky
a jedlemi stolatými při znac-
kování cest od Trutnova ve
Vil. Karlovičích do Horní
Bečvy, jiná vlevo od Orlické,
les nepřístupný s Růženiným
potokem za Královské bučiny, jiné
se neodtrhávají, proto jist
bylinný porost bude mít
množ. místy i schází. Z výc-
íjsích druhů neobsahují tu
Nephrodium monilatum,
Plechum spicant, *Lu-
xura flavescent*, *L. silvatica*,
Gentiana asclepiadea.

2) Na jižním svahu hřebene
Vysoké při znakované cestě
jsou pod královskou bučinou
podél potoka, *L. armoti-
num*, *Luxura silvatica*,
po lesní lince „Rybáře“
kolem leskampového plave-
cka, vpravo *Ranunculus*
platanifolius, *Aconitum*
melpomene a *Geranium sil-
vaticum*.

3) Na Čábu pod kurištic-
kou chatou je zalesněn
bukový les ve 2 partiích
od sebe vzdálených od sebe asi
mladší lesa jílková-
češ. Zde neobsahují *Festu-
ca silvatica*, *Drimona*
aquinonoides, *Salvia glutini-
osa*, *Hedysarum alpinum*.

4) Na Drušni v značko-
né cestě zdejší obecný nízký
pruh bučiny, v nějž vlast-
ně neobsahují vysoké lesy
bučiny v lesích i v leh-
skupinách: *Festuca*
silvatica, *F. gigantea*,

g entrichitet hat.

der gefertigten Fonds-Administration
Während entfallende Fahrzeuge
sowohl seine Eintrittsgebühr als

11

Wäldern

S der eaud. Sparer und Dicare
Sociologicky' mohou zeměděl-
ské bučiny Vlastníků Flor repa-
rátivne, jichž jsou zachovány jen
v menších parkech a pony
bylinné' v nich podlejší pro-
slouly Rytí bučináři.
Floristicky' a sociologicky'
raj bučin se jistě jde o
dobní bučinám v mnoh
zavonitků, kde jsou staré
bučiny zachovány ve velkých
komplexech (Tisůvka, Lomnický
Přík. v Brně ze 1932 str. 31)

Urtica dioica, *Milium effusum*, *Bromus asper*,
Glymnus europaeus, *Carex leporina* f. *argenteoglochin*,
Luzula flavisca.
5) Mladot les bukový
na svahu Rytíček u Žďáru
naj se vleme *Kordiašové* taji
při kameny *granit* *Asplenium*
macrourum.

Epipactis nemoralis,
Luzula flavescentia, *Carex*
intermedia, *Hemionia apinnatifolia*,
dale myře na břecem "Ryb."
Mitglied
des Witwen- und Waisen-Institutes
mit *Carex echinata*
(*C. parvula*) A. B. in
Luzula multiflora, *Rumex*
angustifolius, *Cephalanthes* fü
longifolia, *Sarcophularia*,
Herrn *Lepidium*;

welcher nach § 2 und 4 der Statut
auch alle seit seiner Anstellung in
sammt 6% Verzugszinsen zu Hände
baar und richtig

at
ad sevka Kordiašové na jih
při znakování cesti směrem
k Hovíčku Cardamine
hivonta a lokalita pro
Hemionia apinnatifolia,
6) Viličkovou pod Benesem
Benesem Benesem "po-
stupem", kde kací se zbyly
les bukovito a jidlovito
je velmi pestro lokalita
Nephrodium monachorum,
Pleotoma apicant, *Lysio-*
podium rotundatum, *Po-*l*sen-*
silla procumbens, *Lotus*
nigirostris, *Epilobium*
obscurum.

15.

Les jiblicnathy!
Les jiblicnathy jich zde myří
principne les sunkeny men-
šího rysavovaru jich kult-
ura, stará lesy sunkeny
lyhy i rysavany s první-
činým bukem a jich sucho
se lze a zde samy myře
menity z pionerových starych
stromů ~ stří (selenáci).
Mladot lesy sunkeny ly-
nají bez rodu podrost,
předla lesy ji pokryty to-
liky jehličím, seproce pro
první proletem lesa an-
mo 40 - 50 letek, množství
proudu stromov, propan-
ské vše voda a mizí
rasovou vodu se vlečen, u-
dělán hlyšený, hlyšení to
krenaté žárel a manučka
romá, pak obecný ja-
hadník volka psi a lesní,
hercicka jedovatky,
orýzl a kralatky, jehlič-
ník obecný a locika jedin.
Druhého proudu hlyšení
mizí se na vlečnách,
při lesích okopých a při
mohýzích. Celé proudy
krenaté vystříhané se
lopie ~ nádržích lesích
smrkových na Dusné u
Pláćnic.

Zde můžou proudu
lesa jiblicnatho maledice obvy-
kované v starém náleží
les sunkeny s první činou
jich sucho na břecem nad Rad-
kovem ~ Nov. Hrozenkou;
1. lope Carex sibirica, *Ovalis*
acetosa, *Asplenia adonis*,
Galium rotundifolium, méně
horní *Fragaria rotunda*,

Lonicera fragac. parv rokven-
šení *Nephrodium filix mas*,
Asperula silvatica, *Polygonatum*
vesticillatum, *Anemone europ.*,
Panis quadrifolia, *Mercurialis*
perennis, *Bryophyllum pinnata*,
Candamia simplicifolia,
Dianthus barbatus, *Malva*,
Landrynum monachum, *Fragaria*,
recea, *F. moschata*, **Mitglied**
Daphne cneorum, *Quercus ilex*,
H. hispanica, *Viola canina*,
V. silvestris, *Lysimachia*
nummularia, *Myosotis silvatica*,
Thymus vulgaris fl. alba, *Gingko*

des Witwen- und Waisen-Institutes
reptans, *Salix glutinosa*,
S. vesticillata, *Veronica* A. B.
in
chamaedrys, *V. officinalis*,
V. montana, *Phytolacca*
spicata, *Petasites albus*

Herrn
Prunus purpurea
Sisymbrium lanceolatum

welcher nach § 2 und 4 der Statut
auch alle seit seiner Anstellung in
sammt 6% Verzugszinsen zu Hände
Lactuca muralis.

Z některých místech byly
žíti v rokven blázu duby
plesk'k zdroviny z jih-
ošlezských lesů u Karlovic,
mimožně v mladých dubech par-
níkové a zelené a zelené a z
mladých se v
říto duby sejde.

Z výše uvedených dřevin byly
v některých lesech na-
lezeny: na sv. vrchu
Dolmenov s 723 *Epipactis*
nervosa a *Chionodoxa* agri-
monoides, ~ Na. *Hroznatka*
na hřebeni mezi v dolini
Modřan a Kostelec kon *Cer-*
damine silvatica s *Pota-*
silla procumbens i s *P.*
suberosa (*P. procumbens* ×
P. formosa), ~ Karlo-

vich na Trojáčce často¹⁷
Epipactis latifolia, vý-
čně *Calamagrostis epigea*
nacea ver. subvaria
~ obci Horní Bečve
Nephrodium nocturnum,
Polygonum vivianum
stříbrnaté a
Gentiana asclepiadea,
tam i hojně soniale
porosty horňeky.

Háje

jsou tu málo rozšířeny, nebo-
žup je jaksi pestinky s
ejedinci vše méně husté
v celé oblasti nebo v některých
skupinách rokvenin robusty
listnatky, nejčastěji jsou
to buk, habr, bělolist, lípa,
jízdec jízdec a líška-
ve. Pouze jízdec zasahuje
na hájů významné zde
porosty břekin v obci
Růžice, Rypšice, Val. Rypši-
ci a dále na východ k do-
Solance. Výšky břekin
pocházejí z podzemního
ne výškově magnifikem
proto na východ prvních
skupinách k Bečvi Vodě
ne vzdá blízké břekiny
se nevyskytují. Prviny
by jinou vědou háje opa-
čitivu směr husté
koru porosty, k břek-
inám přinášejí nejvíce
smrk, borovice i osyka.
V obci Solance na hřebeni
mezi západní opevnění
pozor na Solaneckého je
břeková pastvina s několika
výraznými stromy břekin
a jedlemi v výšce 80-100 m.
zde Tato pastvina je významná
obrannou funkci břekin

a místě byly možná jela klečí
ještě, jichž smrk a borovice
nejvýše zde rostou původně,
ale teprve od borovice mimo-
leho se stalo bylo do lemových
povrchů zavoleny.

Významné jsou bezpochyby i
travnaté povrchy Festuca
capillata, kteří **Mitglied**
na neklínatých lepin je
mnohem k jihu vklínatých
svorů souniklé pánevky.

des Witwen- und Waisen-Instituts

A. B. in

fü.

Herrn Laserpitium prutenicum

welcher nach § 2 und 4 der Statute
auch alle seit seiner Anstellung in
sammt 6% Verzugszinsen zu Hände
baar und richtig

Wsetin, am

Zákon o klad povrch lepi-
nového riviéryho lezímu
na hřebeni Hlaváček ne-
malin do obce Val. By-
střice. Mezi povrchem
bezpečným a hajovým včetně
nem je všechno smrk,
borovice osojka a jalovec.
Trávník však svor příkrý,
Festuca capillata, Festuca
mult. Agrostis vulgaris, Am-
phoxanthum odoratum, kteří
Lieplingia decumbens a Narth-
oxandra stricta, mítka i kolonie včetně.
Rostoucí jsou zastupeny
Pendijum aquilelinum, Carex
pallens a C. acutophylla

19. Euphorbia cyparissias, Pollichia
romankoffii, Fragaria vesca, Thymus
serpyllum, Phalaris tristis, Lolium
canescens, Primula veris, Thymus
repens, Veronica chama, V. officinalis, Galium austri-
acum, Antennaria dioica, Centaurium erythraea, Carduus acanthoides, C. vulgaris, Hier-
bas pilosella, H. vulgatum, Leontodon dauricus i his-
panius, L. austriacus

Lapímaný hajový povrch
je odstojíci vzdálený dva
kilometry od vrcholu říčního
pásmi Kamenný výpustek,
Viscaria vulgaris, Trifolium
alpestre, T. rubens, Anthy-
mus niger, Rosa gallica
var. eriophyle, Geranium
sanguineum, Campanula
erucina, Fraxinus excelsior,
Valeriana officinalis var. anguo-
sa, F. salicina, L. hispida, Serrula fimbrosa,
Cirsium heterophyllum, Stipa
acuta, St. tenuissima v. midensis,
St. umbellatum, v. trav-
num povrh vzdálený pás-
soušem jsou Molinia
annua, Carex a Carex num-
erosa.

Lorky, Lorky.

Lorky se jí zde vyskytují málo
mnoho, objevují se na místech
velkých a v menší míře,
když se v oblasti jedou
do roka, nebož do zimy se
trávník uschlá. Mnohé
lorky dřív zahájí na mís-
tach suchých byly v podobě
dobi zeleny, ne proto když

principii lze zceloučením polí,
na nichž pak požadují nad
ním hajné se nezavazují
Reprezenta, takže je takové
členky v dobu když zde
leka jen nápadně!

Klienta může je zde
jednotliví a druhým
dilem vlivem
nezávaznosti konské půdy.
dilem vlivem vyprávění
des Witwen- und Waisen-Institut.

A. B. in

fü

Herrn

welcher nach § 2 und 4 der Statut
auch alle seit seiner Anstellung in
sammt 6% Verzugszinsen zu Hände
baar und richtig

Wsetin, am
doby, když se využívá cel-
ky postižné a pak vystapo-
váním půdy od doby této
mnoha vlastna zbyne a nás-
říji se snaze důlky s plus-
kým a soudním vedenky.

Také v mnoha dobu vyu-
žuje se Klienta lze bmo-
ževnit Thomayerem skuskem
když se proponuje ^{jako} využit
vinn i do myšky skiba i do
hukety kvůli když
sí odkrojeném, tak i
mnohem jedle a jiným i mo-
žílo kvůli, když lze i jí
na kterou vodou písmo-

21.
bezpečné podle článku z
vínam; zvláště vlastnictví a
kromě krajinců mítva.

Mits sociologického po-
čtu lze vlastnictví a
nekolik výkazů výměn
s průkazem na všechny lze
v propisu pohori Jano-
vské ve formě tel. Pří-
~ byly za rok 1932 r. 35-43
michov pohori vlastnictví
kromě kohli potomka a
jednotlivé jako v krajích
Uzavřených, ale tato se
sam nekonec dílce lze
v pravidelném pořádku
a rozsáhlém.

Louky mohou být
v se' původnosti jako byly,
jistě na konci minulosti
sklepy, na mnoha ještě
vli vlastnictví a mimořád-
jí pedodobní patrový,
zvláště v lehkých větvech
odvodních Antikorosinu
na říčkách místy voda
stříby vlnkového (právě
obrácené) dřívější sava tak
vysoké. Také lze využít Thoma-
sova skuskem k zvěřinám v
provoz mnoha využití
a tak se stále, že většinu
nekolika let se mědovac-
mi obecně porosty dost
mení.

Předlaďnicími karinami
jsou ty řecké města a Ag-
orkis vulgaris, s mno-
mén hajné ale vše v
Africkém využívají se
Broza medea, Inkarum-
thum wortatum, Cynodon
cristatus

Arany růží nejvíce počtu
vyskytující se vyskytuje se
jen ojediněle na velkých
místech *Festuca pratensis*,
Poa pratensis, *Dactylis*
glomerata, *Glychomaia ciliata*,
Polygonum, *Trifolium flavescens*,
Aleuropus pratense, *Alopecurus*
pratensis a *Lolium* **Mitglied**
perenne (n. class). Z květen-
sých dřevin byly zde zjištěny:
Stomperum, *Syngonium*,
Luzula Thunb., *Ceratodon oryz-*
des *Witwen- und Waisen-Institut.*
Lepis, *Gripelimum*, *Myrsinaceae*
a *T. pratense*, ze A. B. in
zdejší Karlovarského *Hippocrateum*
maculatum, *Crepis biuncis*,
Hypochaeris maculata,

Herrn

welcher nach § 2 und 4 der Statut
auch alle seit seiner Anstellung in
sammt 6% Verzugszinsen zu Hände

z aktuální *Carum carvi*,
Pimpinella major. *Ceratodon*
prolatus ^{Wsetin, am} v aspectu kruhy
lule a címenem, ale pro vol-
nosti kruhu záleží, bylo mo-
žno hryzem chlévským.

Na vlnkách výšky 100-
150 cm místech luh místek
červených a v dolní
kruhu probíhají řasice ko-
rovník, místek výškou 100 cm
výškou, jinde s průměrem
Cirsium palustre, mezi nimi
bojný *Ranunculus acer* a
R. auricomus, a karmi-
Syrotis alba a *Holcus lan-*
atus, a řasice se vydávají
i po vlnkách výškou *Carex*

²³
vallesiana a *C. paniculata*.
Ze vzácnějších rostlin
byly zde výdatně *Trifoli-*
um fragiferum (Hluboček
a Státní Konec), *Trifolium sp.*
dicoccum (Milonov, Rabštejš),
Gladiolus imbricatus (Milo-
nov), *Geranium phaeum*
(Rabštejš), *Crepis paludosa*
(ants. Krupík a Karlinský),
Carex elongata (a Karl-
inský na Bechyňce), *Me-*
rianthes trifoliata (Rab-
štejš a Karlinský na
Bechyňce a výškách porostek).

~~Lanty Kostřávka, malé vodní Chorý~~
Lanty Kostřávka, vodní Chorý
Vzdušné a povrch luh kru-
hových a místek podmíněn
jednou zdejší půdou živinami
a vlnkami, jindy na vlnkách
deskové voda přímo vyla-
haje a mykoté stéká, tedy
poda stéká více vlnky a
živin méně vlnky přímo luh
místek, kde voda klou-
beji do spodu vrstky. Poda
na vlnkách místek vlnky
více vlnky deskové vlnky
(*Lotus corniculatus*, *Thymus*
serpyllum, *Agrostis capillaris*,
Polygonum perfoliatum,
C. arvensis). Trajná
na vlnkách je výškou vlnky
ve vlnkách pakí karmi.
Původající traviny jsou to
opeř. *Festuca rubra*, *Agrostis vul-
garis*, *Anthonotham odoratum*,
také výškou perenný mají spo-
lečně s luhovými vlnkami.
Jelikož svobodné patro travin
je výškou, výškou i nem
více vlnky Kružná, datovaná
lukovina horšským luhem karmi

červený sluh' mi (česká kraj), je-
stříbřitý pampelišky, růžový
mordýř mi (pravý a horák)
červenými (vstavače).

Zvláště horák vstavače ro-
souci vstavače na luhach u-
dolních, jenž přináší okrasn-
luk ořeškových.

Mitglied

Vzácný se nachází v
východních Čechách me-
zi řekou a říčkou spadecem,
na hřebenech východních
des Witwen- und Waisen-Institut-
jaks v Míru blíže Vse-
stina Orchis nobilis, A. B. in
Gymnadenia latifolia, Veronici fü-
scaenium, ~~Melampyrum cristatum~~.

Herrn

sonth' Herrn!
Lorky ofice horn.
welcher nach § 2 und 4 der Statut
auch alle seit seiner Anstellung in
sammt 6% Verzugszinsen zu Hände
baar und richtig

Wsetin, am

Lorky svědkové
list se od luk ořeškových
prostřednictvím horního parku
jisté místě, ale ve středním
parku na východě Rokycan
a hruškovém výběhu
druhy *Carex pilosa*, *Thymus vulgaris*, *Festuca pratensis*, *Festuca rubra*,
Veronica austriaca

V horním parku uprostřed
travy Flst. mlns., Agrostis
vulgans, Agrostis media
vysočin. polystachys. *Agrostis*
vulgaris

25.
Lorky ofice horn.
Lorky by rozdílem jsem i
klamr ne západních
jihozápadních vrchů
říček do východ. Blízko
severné od města Velké
návsi dlesem Brdy, tak
Lorky Bobrové, Blízko
jihozápadních vrchů vrchů
horního parku vstavače
horní, park vstavače na
ele vyhynulé luh se
nepravidelné, vystupují se
vstavače východních vrchů
vstavače, park jinde
na východě zde vstavače
vystupují se. Z parku
se všechny obvykle
prostřednictvím vstavače
Kohleria ciliata var. py-
ramidalis, Sieglingia dum-
cens, z druhu hruškových
Trifolium repens, T. alpestre,
T. ochroleucum, Geranium
sanguineum, Helianthemum
chamaecistus, ^{mollis} Hechtia-
lepturus, ^{oblongus} Heliam-
pyrum murinum,
Carpobrotus glomeratus,
Urticum parviflorum,
Sergia latifolia, pincatoria.
Festuca capillata, Phleo-
tia je prostřednictvím mohovin
brézin, lemovitých olšovin a
partenin, vystupují se
na luhach jiné vstavače,
soustavě na pastvinách jíly
písceček, kde vstavače v
Rokycanech jiných tráv, je
peč. li meliora ^{uprostřed} nemí-
lukovina. Lorky Kostřavy

Smlouva je na českého hráče
Kočkou, neštěstí, myslí se je
doklánky mezi členy pro
jádrovou, bráni památkám
a vzdělávání a peneraci a
rozvíjení se, tak napříma-
nět' ubírá oráčkům drahém
životu a jeho životu, když je
vláda kysely žensko.

Takže smlouva trvá i a
doklánky Kočkou postačí, a
postačí, když Karel Šimek
ne mít' moci pro své smlou-
vy užit' mimo drahé ži-
voty. ^{(Místo výše č. 23-31 ve}
^{spisu Podzim v Královéhradeckem}
^{okrese v Libereckém kraji,}
^{vedle též v polovině 1961 v Ostravě}
^{č. 13-32 výše 58-62)}
Smlouva vztahuje se Thomas
současnou stranou ke smlou-
vám ředkviček a proměnit se
smlouvám ředkviček Kočkou, ne
má o kyselici žejdo žensko
smlouvy a předpona už-
ší moci smlouvy mimo drahé
životy, zvláště jeho životu.
Smlouva č. 111 je pro samou
stranu Kočkou, která
přidala do této smlouvy nevyjádřenou
smlouvu mimo drahé
životy ředkviček. Dostalo se smlou-
vám ředkviček vlastní názvu, neb se
neměly ředkviček vlastní názvu
a postačí Kočkou až když
se zalesní.

Rozložili byly smlouvy
jeden za druhou. Loutky vás k
na výrob. vrahům Pláčnice
do Val. Bystricce ve výměně
za roky, měd 50 let salas.

písmu nevyjádřené a
proto byly již zrušeny
zalesněny.

správce fonda.

19

členem

technického

zaplacenou:

x) vráh do Pláčnice

zprávy byly

Vdovského ústavu A. V.

NKA

čís. inst.

zprávy byly

Datum směr c. 1811. Zde je
jmeny výkryt Botyohism
lunaria, Opilio glaucum
vulgatum, Thunia flavaeum,
Glaucis us imbricatus, Ab-
randia major. Na koncích
šíře jsou i dva větvičky.

29.
masel drozové volně jeliš,
Nym' tem mle i Prinzipia
volgenis a Periculans sil-
vatica. Lze tedy pro ně
některi jedinci mnoho vlasti-
son, mnoho když 3 vedené může
jinde zde nalezout nebyly.

čím s triopsho- **Mitglieds-Karte**

rum angustifolium,
C. laevigatum, Equisetum palustre
Lacponus rivularius, Carex stellata
C. Sibiricum, C. Zeyheri, C. parvica
C. plana. Calystegia sepium, Lin-
aria vulgaris, Glaucis us imbricatus,
des Witwen- und Waisen-Instituts der evang. Pfarrer und Vicare
Parrotia palustris, Chrysophyllum
Annona, Peperomia abea A. B. in Mähren
Cinnamomum camphora, C. palustre,
Calpurnia palmata.

für

* Herrn

* Herrn kurku, brzy, jazy, aby sezd,
* Herrn i prony hornatky
welcher nach § 2 und 4 der Statuten sowohl seine Eintrittsgebühr als
auch alle seit seiner Anstellung in Mähren entfallende Jahresbeiträge
sammt 6% Verzugszinsen zu Hände der gefertigten Fonds-Administration
baar und richtig entrichtet hat.

Wsetin, am

Na jížních místech lze
Vseto Rych vystýhují se mimo
jiné světlorych, mědáne
směr c. 1811 z velké
luky na Moravu ne mimo
Lisovky do Široké u Ma-
larkové, zde se projíždí
i vliv sepolohami a pro-
chupnivm pismenem a tri-
fetium ochrolancum.

Fonds-Administrator.

Fonds-Curator.

Zelenohorí směrky zade-
laje i světlorych halema
louka, na Brumbešce "na
uzchudném valu Trajácky
jsou některi obec Ořešice,
na vrchol dr. B. Formánka

Pastinum

zabíjí a de posud dosta' před
jsem zde dříví ož uhlí, a
nynětří sebať byly běžně
převelvím než zákonem.
V obou výročích měly pastky
vítěz dřívější pro (složka
dřívější) zemědělosti, pastky
se baly s hroum a hryškou
klamem i plemenem výšky lidské^h
velas a Rho. Výška těch vysok
nášvím ještě a pouze v ně
mečkých smržov i na jiných
vánočních výškách voda ne poloh
i lukačk. Proto chov ovci dne
místy ale město výškový klimi
zaničí a vymozí se chov
kružíku dolyxka, až mělo
z toho mýklejší ovci salář
byly rovnoběžny na město
kromě dřívější pastekové. Na
Berkyši č. 892 ve Val. By
šicí na svahu do vrchu
Tisovec byl jistě před 30 lety
velký salář, kde se pasto
na poloh se vše, různou
daní, když město žal
se, při každé jsem vysí
překvapil a ne mělo vý
někých smilkovin výše
ve výšce 850 m nášvím pastek
a louky (osídlení c. 1880.)

Na větších pastvinách byly
se jistě dřívější galavee, kde i kam
kdy slouha a sotvač, různ
výškov i pleně pastek,
Urtica spinosa, *Euphorbia*
cyparissias, *Carlina acaulis*
a *Ranunculus*.

Hlavní menší pastviny
pastekové byly Agrostis mi
garis a Festuca rubra a
dřívějšími jak Polentilla
cornuta, Lotus cornicu
lates Thymus vulgaris, Am
malia vulgaris a Euphorbia

^{31.} Rosa Roma. Blíže kraj
vysokému ne pastvině i po
vlastní Festuca capillata a
Cortaderia mygdonia.

Na klamém březovém
ve výškách nad 700 m vysokých
a klamé pastinum omil
Is-Karte krov a povrch
převládají, jak je latkach
zmičkách byly uvedeny:
Hlavní provozem omilky
ještě tři Pastek multifloras
ts der evang. Pfarrer und Vicare
Mähren a *Lavanda flavaescens*,
zácník *Bethrichium*
lunaria a *Coccyglossum*
miniale, blýž lem mle
zalni i *Potentilla procumb
ens* s mukou Peten
ella mbegeta (Pet. pro
umbens x *Sorbaria*),
ten sowohl seine Eintrittsgebühr als

Mähren entfallende Jahresbeiträge
der gefertigten Fonds-Administration

g entrichtet hat. Na jížních výškách
z klamé měch K. Blíž vč
Na větších vysokých zá
pastvinách i dřívější Repa
lychni Brachypodium pinnatum
Zonkiana ciliata, *Tetra*
rhizella, *Potentilla*
laciniata, *Cirsium*
aculeatum a *Apolinaria*
mži Rosa elliptica, R.

^{Fonds-Administrator}
mži R. rugosa, ^{no} R. sinuata
a R. Grisebachii. Všich

smrků c. 20, ^{do} 22 ve výšce
Pastekové včetně vysokých a
horních výšek v Horn. spol. a Mor.
Orkavi za 1932 str. 54-56.

33

druhům Alcea rosea,
In foliis mediis,
frigida glauca pallens,
flavescens epiphylloides
Campionis rusticum,
Galium veris, Co-
onta europaea.

Z kromě ujeté již na místech
rozdávaných sice se všude
s-Karte Rosa canina, R.
dumalis, R. dumosa, R. ellip-
sica, R. rubiginosa, R.
septium ve hřebích R. involucrata
a R. Piceae, zvláště jen
s der evang. Pfarrer und Vicare
Mähren na nejzdejších
R. Bečvě Hornského skloněních,
na nejzdejších skloněních R.
světem R. Bečvě Rybníkářské
Kromě R. canina zde
im parku z jinonických
stromů se nejdélej-

en sowohl seine Eintrittsgebühr als
Mähren entfallende Jahresbeiträge
der gefertigten Fonds-Administration
entrichtet hat.

Fonds-Administrator.

Fonds-Curator.

Spatčánské potřeby.

M počtu roků sed' jako
středy nebo když slavní vše.
Alnus incana, A. glutinosa
(nejsou jakehoto), Salix
fragilis, S. alba, S. viminalis
(S. fragilis x alba), S. a-
nygdalina, S. purpurea
S. lucida (S. purpurea x nummularia)

Město.

Trahinku na místech mimo pravidelné
složení jako na pastvinách, ale
mezi dřevnatými písky i vyskytují se
v halech, zvláště rovnou
na místech Kříž. zvláště
na svazích se na místech rot-
lín je vidět méně Anchusa,
Allium elliottii, Lilium
bulbiferum, Stellaria holostea
Ceratium arvense, Ranunculus
uliginosus, R. bulbosus, R.
polyanthemus, Staphis bipinnata
Ficaria glabri, Sedum holo-
niense, Fragaria vesca, F.
collina, Potentilla recta, P.
repens, Aquilegia vulgaris,
Lamium galeobdolon, Trifolium
pratense, Helianthemum characoides,
Thymus vulgaris, Origanum
vulgare, Calamintha acris,
Cotula globose, Petroselinum, Salvia
verbenaca, Betonica offici-
nalis, Lycopus officinalis,
Galium verum, G. mollugo,
Gnaphalium uliginosum, Leontopodium
virginicum, Origanum vulgare,
Linaria prostrata, Pieris
hirsutissima, Pyrola

Malva alcea, Potentilla
canescens, Ledebouria lati-
folius, Teucrium chamae-
strys, Lilium arvense, i-
caricum rotundum je zde
zabránilo Lenitcam offi-
cinalis, Impatiens rotun-
diflora, Bryonia alba,
Cästeki Chrysanthemum
parthenium. Ata vysky-
tuje se v halech i v lese
Pratagensis virginicus, C. mo-
nocephala, C. campestris,
Coronilla anglica, Lonicera
caprifolium, Primula spinosa,
Rubus caesius, R. polystachys,
R. phryganoides, [Rubus]
Pod Křížem stojí zvláště

S. cincta (nugādēj. pro
 novem pēt. hystri) ~~hystri~~
S. aurita (zohasti na dñsni)
S. viminalis se pěstuje i n
 výhodach kultivací, *S. damp
 noides* může se sázet
 vči. "Kvěckam", *Populus*
 nigra a *P. alba* včetně
 sázky. Z leh. nachází
 se v krás. potocích ajich-
 nile *Tamnula alata*, *Cornus*
 sanguinea, *Viburnum opu
 lus* a *Prunus padus* nem
 th. rýčem. Mezi krás.
 potocním oblasti se v místech
 v krás. amby stříme a hygro-
 filní *Lycopodium caninum*,
Poa trivialis, *Hierochloë* tu
 penhus, *Malaxis* ag
 sicom, *Stellaria nemorum*,
Ranunculus ficaria, *Vicia*
 sepium, *Lathyrus palustris*,
Trifolium pratense,
Receptaria pratensis,
Angelica silvestris, *Mitchie
 cus silvestris*, *Lysimachia*
 vulgaris, *Convolvulus* hu
 gonis, *Moneta silvestris*,
M. verticillata, *Lathrus*
squamaria, *Valeriana*
officinalis, *Polygonus offi
 cinalis*, *Citium palustre*,
virginicum nek *Ranunculus*
caeruleus, *Glaucium mi
 nus*, *Sophora apiculata*,
 Na výhodách u Bečev den
 de *Hieracium latifolium*, *Le
 nularia apiculata*, *Asper
 ula apiculata*, *Solidago*
canadensis, *Tanacetum*
vulgaris.

Společenstva mohou být
 nacházet se nejvíce na mo
 kránech v místech blízko vod
 a v silně vodních pro krajích:
Corynephorum heterophyllum, *C. li
 nuum*, *Triglochin palustre*,
Sparganium ramosum,
Utricularia foliacea,
Airaria rivularis,
Scirpus riparius,
C. canescens,
Urtica dioica, *Urtica* ^{rum}
 - *Urticaria* ^{rum} *californicum*,
U. angustifolium, *goudotii*
 (variet. *stellata*, *C. foliacea*, *C. riparia*
 s der evang. Pfarrer und Vicare
carpalis *lancea* v. *hirsutissima*)
 Mähren *C. hirsuta*,
Phragmites communis, *Phragmites*
^{rum} *australis*, *Blyelia fusca*,
B. glaucata, *Stephanomeria*
^{rum} *monilifera*, *Agrostis capillaris*,
Ligustrum vulgare (sází se i
 mývalo do mokřin)
 En sowohl seine Eintrittsgebühr als
 Mähren entfallende Jahresbeiträge
 der gefertigten Fonds-Administration
 entrichtet hat. *Zizanius emarginatus*,
Z. glaucus, *Z. longior*, *Z. sulcatus*,
Z. orthocaulatus, *Z. compactum*,
Polygonum hydropiper,
P. mitile, *P. amphibium*,
Ranunculus flammula,
Caltha palustris, *Stella*
ria *alpinus*, *Barbarea*
vulgaris, *Cardamine amara*,
C. pratensis, *Roripa ni
 vellosa*, *Trifolium hybridum*,
 Fonds-Curator.

Hypericum acutum,
Luzula ^{rum} *galea*, *Reptis*
porkula, *R. pilosum*,
Ranunculus ^{rum} *flammeum*, *R. laevigatum*,
R. natans, *R. macrorhizum*,
Consolium umbellatum,
Myosoton aquaticum,
Vallisneria ^{rum} *simplicifolia*,
Polygonum ^{rum} *trifurcatum*, *Polygonum*
clavatum, *Lycopus*
europaeus, *Vinca* ^{rum}
magallanica, *V. minor* ^{rum} *bungei*

V. serpyllifolia, *V. scutellata*,
Tephrosia resupinata, *Gilia*
patens, *Liriodendron tulipifera*, *Cirsium oleraceum*, *C. rivulare*, *Crepis paludosa*. *Nicotiana tabacum* se. *syntheticum*,
klam. *Urtica dioica* subreduplicans,
Cupressus sempervirens, *Quercus*
maxima na. *Acacia*
na. *Sassafras* a red pri-
marden & *Bystropogon*).

Nicotiana tabacum subreduplicans
klam. *Prunus* *Becconis* n. *Nicotiana*,
Barley *mollis*, *P. gracilis*,
P. Fomentorum, *P. veronicae*,
P. amplexicaulis, *P. petiolaris*,
P. glabra. *N. silvestris*
m. *Leptophyllum* *spissifolium* na
vnde *Lesma* *nigra*,
Callitricha *venosa*, *Mimosa*
polyphyllum *spicatum*,
n. *Salicornia* *achillea* rotke
Typha *latifolia*, v. *mitrata*
ských růžových výstupí
vaji *Polygonum* *amara*, *guttatum*,
P. pectinatum, *P. nubigenum*,
P. crispum.

Thlaspi *romandi*
rotke klam. mei *chalcedonicum*
a n. cert. *Veronica* *de*
oblonga: *Bromus* *multiceps*,
Malva *urticae*, *M. diocia*,
Rumex *conglomeratus*,
R. crassipes, *R. oblongifolius*,
R. acetosella, *Polygonum*
multicarinatum, *P. perfoliatum*,
P. lepatispermum, *P. fomentorum*,
Chenopodium *album*, ch.
glaucum, *Chenopodium* *boissieri*, *Hen-*
nicus, *P. dentatum*, *P. perfoliatum*,
Armenia *annua*, *A. syriaca*,
Chelidonium *majus*,
Alliaria officinalis, *cha-*
mæplicium *officinale*, *Asym-*
biuum *repens*, *Diplaster*
numeralis, *Dactylis* *verna*,
Amorpha *moquiniana*,

Cirsium canum (fir sec.
od Vsetina).

Rissoa *lutea*, *Potentilla*
argentea, *P. reptans*, *Pot.*
ansérina, *Trifolium com-*
periale var. *minimum*,
Cowwilla venia, *Urtica*
officinalis, *M. album*,

's-Karte' *Artemesia glycyphyl-*

lus, *Geum* *urbanum*,
columbinum, *G. primuloides*,
Gypsophila *helioscopis*,
G. strobila, *G. polycarpha*,
G. cyparissias, *G. escula*,

der evang. Pfarrer und Vicar
Mähren *Ficus carica*,
Totilis antithroca,
Solanum nigrum,
Serpentaria *indica*,
Cochlearia *vulgaris*, *Lamium*
album, *Filicopsis angusti-*
olia, *Linnaria vulgaris*,

en sowohl seine Eintrittsgebühr als
Mähren entfallende Jahresbeiträge
der gefertigten Fonds-Administration

entrichtet hat. *Plantago major*,
Hipsacis *silvestris*, *Bellis*
perennis, *Brizella cana-*
densio, *Anthemis cornuta*,
Melica *chamomilla*,
M. discolor, *Artemisia* *virginica*,
Frula britannica

Actinum *cappa*, *A. to-*
mentosa, *A. minus*,
Genista *virocosus*, *S. silve-*
strous, *S. berberidifolius*,
Trifolago *farfara*, *Car-*
dus *acanthoides*, *Cirsium*
lanceolatum, *Cichorium*
intybus, *Hippocratea* *annua*,
Radicalis, *Farex* *com-*
 officinale, *Nepeta* *capensis*,
Bromus *stans*, *B. ses-*
sorium, *Candolme*
drabs, *Melandrym* *album*,
M. noctiflorum, *Malva*
silvestris, *M. rotundifolia*,
Medicago *sativa*,

~~Veronica spicata~~ Verbenae officinalis, V. Verbena officinalis, Carduus crispus (gen. scv. or Vacken),

Veratrum album, ~~Veratrum californicum~~, Saponaria officinalis, Verbascum nigrum, Pastinaca sativa, Lampronia communis var. viridis Petermann.

Pohls' plante

veternm alieni: Agrostis arenae, Poa annua, P. compressa, Agrostis capillaris, Poa annua decolorans, Agrostis spica verna, Agropyrum repens, Lolium perenne, Thlaspi arvense, Polygnum comosum, Polypodium vulgare, P. lapathifolium, P. concolor, vulnus, Chrysopodium polystachyum, Atriplex halimus, Agrostis pumila, Hellenia media, Ranunculus repens, Sparganium arvense, Elatostoma annuum, Lajinia procumbens, Papaver rhoeas, Tulipa officinalis, Thlaspi arvense, Linapis arvensis, Raphanus raphanistrum, Stenophyllum Thlasianum, Tragopogon chelidonoides, Capsella bursa-pastoris, Sagittaria paniculata, Trifolium arvense, T. campestre var. major, Viola hirta, V. tricolor, V. crassa, V. segetalis (~~V. villosa~~, V. angustifolia), Geranium dissectum, Gnidium cicutarium, Cuphea helioscopis, G. escula, ~~G. villosa~~.

G. exigua, Viola tricolor, Anthriscus cynapium, ~~Dianthus~~ carota, Lychnis viscaria, lana, Anagallis arvensis, Convolvulus arvensis, ~~Convolvulus~~ ^{oru} Thlaspi intermedium, ~~Thlaspi~~ ^{Martha} arvensis, Lysimachia purpurea, ~~Lysimachia~~ ^{Stellaria} palustris, Ocleria hastatum, G. angustifolia, G. herbibus, G. pubescens,

Veronica arvensis, V. formosa, V. hederifolia;

der evang. Pfarrer und Vicare

Mähren ~~Heracleum sphondylium~~ ^{herba} _{arv.}, Heracleum sphondylium, Galium aparine, Campanula rapunculoides, Valerianella dentata, Anchusa arvensis, Senecio vulgaris, Gnaphalium uliginosum,

en sowohl seine Eintrittsgebühr als

Mähren entfallende Jahresbeiträge

der gefertigten Fonds-Administration

Cirsium arvense, entrichtet hat. Lactuca cyanus, C. obovata, Lapsana communis, Sonchus laevis, S. asper, S. arvensis if. uliginosus, minima heppii, Ranunculus arvensis, Lepidium campestre, ^{Fonds-Administrator} Lathyrus tuberosus, Milium pyrum album (~ Nov. Horizontale)

^{Fonds-Curator} Cornufera microcarpa (^{retusa}), Leontium maximum, Lycopsis arvensis, Lithospermum arvense, Melampyrum arvense, Linaria minor, Crepis setosa, P. viscosa, ^{viscosa} oxasneji, Achillea millefolium, Oenanthe stricta, Cerinthe minor

Antennaria ^{verb.} *montana*,
Linnia elatine, *L. spinosa*,
Valerianella amurensis, *Mel-*
nicaea involuta.

Pleurella *spicigera* *Spicigera*
zvěstová osivem dovo-
zeným ze říček Moravy.

Skalní

!s-Karte

Thlaspi ~~oblongum~~ *rotundifolium*,
zvěj na skalách a v dolinách
na prokladě Andělo-
ho vikovce magnoli-
hostéti skalní radikály
se v Valdštejně v n'olci
Skalník, *Bryophyllum*
na vrcholu Klečovič ve
Vel. Karlovicích v n'olci
Láznění. Hlavní mě-
stána na skalách bě-
vaneck obecní kapradiny,
zvěčný *Polygonatum*
vulgare, *Dryopteris* *poly-*
psis, *D. pinnatula*, *Apol-*
nium *anthrenoides*, *Epo-*
sperma *foliolos*, netek
rostek na skalách Lom-
čera nigra a jiné kři-
nob strunkové v dřevních
jedincích.

Zvláště zvěčněno jsou
pro Karlova Valtice skály
kde tyto druhy: *Nephro-*
dium nudum, *Blechn-*
um spicant, *Lycopodium*
selago, *L. annotinum*,
Festuca rubra, *F. capi-*
lata, *Carex pulchra*,
C. umbrosa, *C. elongata*,
C. tenuior, *C. heterostachys*,
Luzula flaccida, *L. sylvatica*,

s der evang. Pfarrer und Vicare
Mähren

en sowohl seine Eintrittsgebühr als
Mähren entfallende Jahresbeiträge
der gefertigten Fonds-Administration
entrichtet hat.

Fonds-Administrator.

Fonds-Curator.

Ceratopetalis varians Cte
Cephalanthus longifolia,
Orechia montana var. ^{can}
diidissima, ^{nue} decomposita
Pyrenaria stroblii, *Rumex*
aristolochia, *Thalictrum* sp.
Ligustrum, *Cardamine*
silvatica, *C. hirsuta*,
Arenaria aquinensis,
Potentilla procumbens,
Rosa elliptica, *R. rubiginosa*,
R. sepium (no var.
modesta var. *Flexuosa*),
Trifolium pratense,
Lathyrus nigerinus, *Gym-*
lobium oblongum, *Abra-*
sia major, *Scrophularia*
Scopolii, *Galium verum*,
Milium effusum muranicum,
Hedysarum muricatum,
Cirsium heterophyllum.

Nicotiana tabacum: *Vera-*
num lobularium, *Lilium*
metagynon, *Anemone*
pyramidalis, *Lunaria*
rediviva, *Lascpitium*
pruthanicum a *L.*
latifolium.

Neamt' Natašky k' ha
podstavce slyčn' n'zems
ne kolika areál' roklis-
tých. Od repredu m'is Mo-
řan opavské pohoršt.

✓ *Lindernia europaea* Rchb. proleta
(~~lindernia~~), od mysliv-
ny Kláš. jedinci lesa
idem Košákovský Rchb.

~~Geocrypta pyrula~~ d'vad' slouží

~~lucia~~ a leont'

vodní dřívka leonid a lucia
jist' jeho jméno.

Wsetin, am

bar und richi

samt 6% Uerzugszinsen zu Hande
auch alle seit seines Anstellungs in
welcher nach § 2 und 4 der Satu-

Herren

A. 3. in

des Witwen- und Waisen-Institu-

Witlige

z nich
Chamaecyparis roxburghii var.
douglasii — *Abies*
~~halei~~ *halei* *var.* *prostrata*
~~halei~~ *halei* *var.* *longa*, *Abies*
moorei *flexuosa*, *Abies*
stricklandii, *Betula* *pendula*,
collina *mitigata*,
Vaccinium myrtillus.

do městského parku
jedinci patří illyrsko-karpatské, z nichž jen některé
stály se v lesích východně
rovněž, jako *Sartoria*
glandulosa a *Gymnosperma*
Is-Karte *angustifoloides*,
~~xx~~

ts der evang. Pfarrer und Vicare
Mähren

Týmila' domky na východě
Beskyd nad hřebíčkou hřebíčkou
v oblasti Kostomlat a Horní
Blatné, *Nepenthis mucronata*,
Anemone, *Blechnum spicant*,
Festuca nilotica,
Calamagrostis arundinacea
var. *multiceps*, *Gentian*
oreodoxa.

2) Od východní provincie

ten sowohl seine Eintrittsgebühr als
Mähren entfallende Jahresbeiträge
der gefertigten Fonds-Administration
g entrichtet hat.

3) Hředlemeřské domky
se zplývají z nového
do oblasti Karpat
východní Bečvy ze Štítů,
Moravy, ale v mezejích
toho nejvýchodnějšího hřebíčku
na jižní východě v dolní
Bečvě v oblasti Velkého
Bohanova, Horeši, Malen-
kovic, pak na zapadní
východě v dolních ~
Růžové. Nejvíce domků koh
natáčí se v oblasti Velkého
na východě Prostředních
(vzhledem k T.) *Brachyp-*
dium primatum, *Abelmos-*
chyspha var. *pyramidalis*,
Dactylina minima, *Potentilla*

Fonds-Administrator.

Fonds-Curator.

alba, Rosa gallica var.
biotyla, Trifolium
rubens, T. alpestre, T.
versicolor, Galium
miguelii, Gramineum sangui-
neum, Gentiana villosa,
Salvia pratensis, S. ver-
ciliolata, Brunella
laciniata. V dnešejch
časich jinovvarých om-
suzí se dnešky ty blamí-
na Brachypodium prim,
Gramineum sanguineum,
Gentiana villosa, Brunella
laciniata, Crisium
acutum a Septolystri
mži Rosa elliptica, R.
multijuga a R. alpina.
Tak na pravdu; že dnešky
Septolystri nepronikly
blaníci do nádolek v řeky
Bystřice, ty obecným
Brachypodium firmatum,
Gentiana villosa, Salvia
pratensis, L. verhüllata,
Brunella laciniata my-
skyskupí a blamí, Riz-
olet, na horách lze
Bryum - Hlavěcky Boa

Hypnum pratense, stato
n myšleni mži Brachy-
podium a jin způsobí so-
zóny se Agrostis em-
patoria, Gentiana villosa
Salvia verhüllata a mi-
septolystri mži region
až za Karpaty. Prvčím
okolí mohlo být kles-
ákem a nejedloum
zemím vzhledem k
Rozloze myšlenky leží na
horách hor Vratislav.

Is-Karte

s der evang. Pfarrer und Vicare
Mähren

en sowohl seine Eintrittsgebühr als
Mähren entfallende Jahresbeiträge
der gefertigten Fonds-Administration
entrichtet hat.

Fonds-Administrator.

Fonds-Curator.

~~Provek Rekar prezbytý zit
jim sporí za hrušky.
Z myznomých drahých kar-
patoch jsou hrušky jin
dostatečně sladidlo a
kupohrívci a myzgádati.
Rato výmleky u polníků
ve městech poté hálk.~~

~~Také dřeviny florae
vyskytuje se hrušné na
smrkovinách a lesích
v Rakousku. Jsou drahý kar-
patoček mezi významnými
jsou i jiné ve Škarpini
Sibř., Lusátky a jejich
přírodních přírodních
stacionech vyskytují se
v Krkonoších a Krušných
horách obvykle v letech.
Johannová florae,
Janopoldská Scopula
lenček a karpator v letech
kdy se hrušny v dolní do-
ná dolí. Složení jsou i
v některých Karpatách
v některých jen vysoké
Roku jde o myznomé
druhy lepčí moře
kdy se ve výčetech ih-
ravě nekteré potenciálny
vyskytují v letech
Předp. Krušn. Mor 1924~~

I 500.

Is-Karte

's der evang. Pfarrer und Vicare
Mähren

ten sowohl seine Eintrittsgebühr als
Mähren entfallende Jahresbeiträge
der gefertigten Fonds-Administration
entrichtet hat.

Fonds-Administrator.

Fonds-Curator.

ls-*Karte*

's der evang. Pfarrer und Vicare
Mähren

ir

ten sowohl seine Eintrittsgebühr als
Mähren entfallende Jahresbeiträge
der gefertigten Fonds-Administration
g entrichtet hat.

Fonds-Administrator.

Fonds-Curator.

I když Kvitonu Vat-
ským byl myšlené ne-
máne některé zvlášt-
nosti, jest zíjí klavírem
anakem jeho hranou
porovná a chodí dle sm-
ěru. Znák tam je patrný
zvláště na vlastní světlosti,
když se vždy jíží příce
vydávají porovnání poslední
v místech pohodaček kuchař-
ek ne ~~sedí~~ denky kyslo-
sýbre. Také v užití
je Kvitonu jeho hranou
si ne v na klečeprádlo osa-
zí, kde se může mít
intenzivní ruská.

Vyprávání jest vellon
právě jeho vlastnosti
zdejší Kvitony,
jž má klavír původ
v moje rukou nem po-
klopnou křížem kro-
míkou.

- Konci -

Is-Karte

s der evang. Pfarrer und Vicare
Mähren

en sowohl seine Eintrittsgebühr als
Mähren entfallende Jahresbeiträge
der gefertigten Fonds-Administration
entrichtet hat.

Fonds-Administrator.

Fonds-Curator.